

納入規格書

商 品 名	大豆イソフラボン 4 0 %		
一 般 名 称	大豆抽出物		
最終製品での 推奨原材料表示名	例) 大豆抽出物		
成 分 又 は 組 成	本品は、ダイズ <i>Glycine max</i> Merrill (<i>Leguminosae</i>) の胚芽を含水エタノールで抽出して製したエキス末。		
分 類	食品原料		
納 入 業 者 及 び 問 い 合 わ せ 先	松 浦 薬 業 株 式 会 社		
	所在地	愛知県名古屋市中昭和区円上町 2 4 - 2 1	
	TEL	052-883-5151	FAX 052-883-5159
製造工程図			
＜中国 浙江恵松製薬有限公司＞			
大豆 △ 含水 ◇エタノール 秤量 原料規格試験 △ ○ ろ過 濃縮 カラム処理 濃縮 殺菌 噴霧乾燥 整粒 混合 充填 日本 松浦薬業(株) へ輸出 ◇輸出品試験			
＜日本 松浦薬業株式会社＞			
中国から輸入 △ ◇製品規格試験 入荷 ※充填 包装 ○ ◇包装検査 △ 原 料 ○ 工 程 ◇ 試験検査			
※ 1 k g 包装の場合のみ行う			
包 装 形 態 (基 本 形 態)	内 容 量	1 k g	5 k g
	内 装	アルミラミネート袋	ポリエチレン袋
	外 装		アルミラミネート袋
	輸送形態	クラフト袋又はダンボール箱	ダンボール箱
品質保証期限	輸入後 4 年 (未開封)		
配 合 率	大豆エキス： 1 0 0 %		
由来原料原産国	大豆：中国		
遺伝子組換え農産物	大豆：非組換え		
アレルゲン物質	大豆		
製 造 国	中国	最終包装国	1 k g：日本 (愛知県) 5 k g：中国
ロット番号の 構成	2 3 0 1 A ① ② ③	①輸入年西暦下 2 桁 ②輸入月 ③同月内に複数ロット輸入した場合の輸入順位	

規 格 及 び 試 験 方 法		
項 目	規 格 値	試 験 方 法
性 状	本品は淡褐色の粉末である。 カラーチャートを用い、C 0 ～ 5 + M 5 ～ 3 0 + Y 3 0 ～ 5 0 + K 0 ～ 1 0 の範囲 であることを確認する。	官能試験
純 度 試 験 重 金 属 ヒ 素 小 麦 タ ン パ ク 質	2 0 p p m 以下 1 p p m 以下 6 0 μ g / g 以下（暫定）	日局、重金属試験法、第3法 日局、ヒ素試験法、第3法 外部試験機関による
乾 燥 減 量	5 . 0 % 以下	日局、乾燥減量試験法 (2 g 、 1 0 5 ℃ 、 6 時間)
定 量	総イソフラボン含量 4 0 % 以上	日局、液体クロマトグラフィー
菌 試 験 細 菌 数 真 菌 数 大 腸 菌 群	1 0 0 0 / g 以下 1 0 0 / g 以下 陰 性	食品衛生検査指針
試 験 頻 度	ロット毎に試験する。	
試験成績書添付	可	
取り扱い上の 注意事項	・こぼしたり、付着したまま長期間経過すると、ふき取りにくくなる場合がありますので、早めに取り除くようにして下さい。	
保管上の 注意事項	・吸湿性がありますので、気密容器又は密封容器に入れ、湿気を避けて保管してください。 ・直射日光、高温を避けて保管して下さい。 ・保管状態が悪いと、吸湿や変質することがあります。	
その他特記事項	・2006年、内閣府の食品安全委員会新開発食品専門調査会より、大豆イソフラボンの安全な上乗せ摂取量の上限値を30mg/日以下（アグリコンとして）にすべきとの見解が出されています。（大豆イソフラボン30mg（アグリコンとして）は、本品60～65mgに相当します。） ・本品の製造工場では小麦を含む製品と共通の設備を用いています。	